

Erklärung der Abbildungen.

(Dieselben sind mit Microscop Zeiss und Camera lucida Abbe gezeichnet.)

Taf. I.

- Fig. 1. *Termitodiscus Heimi* Wasm.; a, Fühler; b, Unterkiefer; c, Unterlippe; d, Oberlippe; e, Oberkiefer; f, Vorderschiene und Fuß; g, Hinterbein.
- Fig. 2. *Myrmedonia (Glossacantha) tridens* Wasm., Unterlippe; a, Abdominaldornen des ♂ von vorn; b, der Mitteldorn von der Seite.
- Fig. 3. *Chaetopisthes sulciger* Wasm.; a, Fühler; b, Unterkiefer.
- Fig. 4. *Corythoderus gibbiger* Wasm.; a, Fühler; b, Kinn und Unterkiefer; c, Kopf von vorn.

Taf. II.

- Fig. 1. *Wroughtonilla lobopeltae* Wasm.
- Fig. 2. *Thorictus Heimi* Wasm.
- Fig. 3. *Cossyphodinus indicus* Wasm.; a, Fühler unter der Kehplatte; b, Unterkiefer; c, Vorderfuß; d, Unterlippe.
- Fig. 4. *Cossyphodes Bewickei* Woll.; a, Fühler unter der Kehplatte; b, Unterkiefer; c, Vorderfuß.
- Fig. 5. *Schizillus Rogersi* Wasm., Kopf und Fühler.
- Fig. 6. *Tetranillus costatus* Wasm., Kopf.
- Fig. 7. *Myrmecolixus Braunsi* Wasm.; a, Fühler.
- Fig. 8. *Pogonoæenus Kraatzi* Wasm.
- Fig. 9. *Termitotropha O'Neili* Wasm.; a, Fühler; b, Unterkiefer; c, Vorderschiene und Vorderfuß.